

# 骨質疏鬆 風險評估

## 【血液檢驗項目包括】

血清鈣及血清磷  
Calcium & Phosphorus



當血液中的鈣磷濃度失去平衡，相關的疾病可能影響骨質的合成作用，進而造成骨骼病變

副甲狀腺激素  
PTH



調控體內鈣磷平衡和骨骼代謝速率，PTH濃度高會引致鈣質從骨骼流失

維生素D  
Vitamin D



促進腸道吸收和腎小管對鈣、磷的吸收。濃度低會導致鈣吸收減少，過高可能會引發繼發性的骨質疏鬆症

$\beta$  骨膠原蛋白碳末端胜鏈  
Beta-CTX



骨質膠原分解過程的產物，可作為骨質流失的指標

第一型前膠原蛋白氮端前胜鏈  
P1NP (Total)



骨質膠原合成過程的產物，可作為骨質生成的指標

## 你會否是高危一族??

- 長期腰背痛、關節痛
- 停經婦女年過50歲
- 體型瘦，骨架偏小
- 2019冠狀病毒病康復者\*

\* 香港大學醫學院由動物研究發現，感染2019冠狀病毒病可引致炎性骨質流失。

# \$1,100

查詢計劃內容:  
WhatsApp  
(9170 4069)



預約:  
WhatsApp  
(9249 1904)



1. 檢測費用不包括醫生診症費及解釋報告之收費、藥物、額外檢查及治療費用
2. 以上收費只適用於門診部，收費及內容如有更改，恕不另行通知
3. 不能與其他折扣或推廣同時使用



歡迎電話或 WhatsApp 查詢及預約!



3971 9980



9249 1904



enquiry@pbh.hk



http://www.pbh.hk



寶血醫院



九龍深水埗青山道 113 號  
113 Castle Peak Road  
Sham Shui Po, Kowloon  
Hong Kong